

Test č. 2 ze zoologie

Pernatá zvěř (ptáci)

1. Z kachen hnízdí ve stromových dutinách:

- a) kachna divoká,
- b) polák velký
- c) hohol severní

2. U dravců jsou většinou:

- a) samci větší než samice
- b) samice větší než samci
- c) obě pohlaví jsou stejně velká

3. Mezi hrabavé patří:

- a) tetřev hlušec, holub hřivnáč, koroptev polní
- b) tetřev hlušec, tetřev obecný, jeřábek lesní
- c) lyska černá, tetřev obecný, krocan divoký

4. Volavka popelavá hnízdí:

- a) ve všech typech prostředí
- b) převážně v polní krajině
- c) převážně v okolí stojatých vod

5. Mezi měkkozobé patří:

- a) holub hřivnáč, holub doupňák, hrdlička zahradní
- b) holub hřivnáč, holub doupňák, koroptev polní
- c) holub hřivnáč, holub doupňák, jeřábek lesní

6. Pernatá zvěř má vytvořené:

- a) pouze neprůhledná oční víčka
- b) pouze průhlednou mžurku
- c) neprůhledná oční víčka i průhlednou mžurku

7. Plíce pernaté zvěře jsou tvořeny:

- a) plicními sklípky
- b) tenkými trubičkami
- c) plicními sklípky i trubičkami

8. Kachna březňačka je synonymum pro:

- a) kachnu divokou
- b) lžičáka pestrého
- c) poláka velkého

9. Temeno a týl hlavy dospělé poštolky je:

- a) u samce hnědé, u samice šedé
- b) u samce šedé, u samice hnědé
- c) není rozdíl mezi pohlavími

10. V ČR žije vrána:

- a) pouze černá
- b) pouze šedá
- c) černá i šedá

11. Výr velký snáší:

- a) 1 skvrnitě špičaté vejce
- b) 1 – 3 bílá kulovitá vejce
- c) 3 – 6 zelených oválných vajec

12. Pohlavní dimorfismus u bažantů je patrný:

- a) po celý rok
- b) jen ve svatebním šatě
- c) není parný vůbec

13. Početnost koroptve polní se v 20. století:

- a) výrazně zvýšila
- b) výrazně snížila
- c) zůstala přibližně stejná

14. Dominantní potravou motáka pochopa jsou:

- a) savci a ptáci do velikosti mladého zajíce a koroptve
- b) větší savci a ptáci než zajíc či koroptev
- c) ryby, obojživelníci a plazi

15. Zrcátko u vrubozobých je tvořeno:

- a) barevnými pery v křídlech
- b) barevnými pery v ocase
- c) barevnými pery na hlavě

Srstnatá zvěř (savci)

16. Mezi hlodavce patří:

- a) zajíc polní, bobr evropský, nutrie
- b) zajíc polní, bobr evropský, ondatra pižmová
- c) bobr evropský, ondatra pižmová, nutrie

17. Zajáci při trávení potravy produkují:

- a) pouze řídký trus
- b) pouze bobky
- c) nejdříve řídký trus, který požívají, posléze tvrdé bobky

18. Zajíc polní je naše:

- a) původní zvěř
- b) byl k nám přivezen asi ve 13. století
- c) byl k nám přivezen v 18. století

19. Původ současné populace bobra evropského v ČR vznikla:

- a) pouze reintrodukci
- b) reintrodukci i přirozeným návratem
- c) pouze přirozeným návratem

20. Norek americký se od vyhubeného norka evropského pozná podle:

- a) bílého horního pysku
- b) bílého spodního pysku
- c) bílé náprsenky

21. Jelen evropský, který má na levé lodyze 5 výsad a na pravé 6 se nazývá:

- a) desaterák nerovný
- b) dvanáctérák nerovný
- c) jedenáctérák nepravidelný

22. Ondatra pižmová obývá:

- a) břehy vodních ploch
- b) lesní porosty
- c) skalnatá prostředí

23. Kolik kusů srnčí zvěře se ročně loví v ČR?

- a) přibližně 100 000
- b) přibližně 5 000 000
- c) přibližně 20 000

24. Daněk evropský s druhým parožím je:

- a) nejčastěji slabý lopatáč
- b) nejčastěji špičák
- c) nejčastěji vařečkáč

25. Jezevec lesní váží:

- a) 1 – 4 kg
- b) 5 – 20 kg
- c) 21 – 35 kg

26. Mýval severní pochází ze:

- a) Asie
- b) Severní Ameriky
- c) Jižní Ameriky

27. K morfologickým adaptacím vydry říční k životu ve vodě patří:

- a) plovací blány pouze mezi prsty předních končetin
- b) plovací blány pouze mezi prsty zadních končetin
- c) plovací blány mezi prsty obou párů končetin

28. Liška obecná se živí mimo jiné i lesními plody, zdechlinami či lidskými odpady:

- a) běžně
- b) nikdy
- c) pouze při nedostatku drobných hlodavců

29. Co je to vytloukání u srnce?

- a) odstraňování z parůžků odumřelých lýčů otíráním o slabé kmínky stromů nebo keřů
- b) způsob odstraňování staré srsti, dvakrát ročně
- c) způsob vedení souboje mezi srnci, kteří mají shozené paroží a tlučou se předními běhy



Správné odpovědi:

1. c
2. b
3. b
4. c
5. a
6. c
7. b
8. a
9. b
10. c
11. b
12. a
13. b
14. a
15. a
16. c
17. c
18. a
19. b
20. a
21. b
22. a
23. a
24. c
25. b
26. b
27. c
28. a
29. a